

เลขที่หนังสือ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสอบกลางภาค

วันที่ 11 ตุลาคม 2558

วิชา 215-221 Engineering Mechanics II

ประจำปีการศึกษา 1/2558

เวลา 09.00-12.00 น.

ห้อง R200, A400, S201, หั้วหุ่นยนต์

คำสั่ง

ข้อสอบมีทั้งหมด 4 ข้อ 10 หน้า ทำหมดทุกข้อในข้อสอบ

ห้ามนำเอกสารใด ๆ และ เครื่องคิดเลข เข้าห้องสอบ

อนุญาตใช้ดินสอ และใช้หน้าหลัง ได้

เขียนเลขที่หนังสือ (จากใบเซ็นชื่อ) ลงใน ☐ ที่หน้าปก (ถ้าไม่มีหัก 1 คะแนน)

ผู้สอบ ชื่อ-สกุล.....รหัสนักศึกษา.....ผู้สอน.....


ผู้ออกข้อสอบ และ คะแนน

ข้อ	ผู้สอน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	อ.ชลิตา หิรัญสุข	20	
2	รศ.ไพโรจน์ ศิริรัตน์	20	
3	ดร.จีระภา สุขแก้ว	20	
4	ดร.สมชาย แซ่อึ้ง	20	
	รวม	80	

ข้อ 1. (20 คะแนน) แรงและความเร่ง ออกข้อสอบโดย อ.ชลิตา หิรัญสุข

กล่อง A และ B ต่างมีมวล m และมีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของทุกพื้นผิวเท่ากับ μ ถ้าแรง P ดึงให้กล่อง A เคลื่อนที่ จงหาความเร่งของ A ในแต่ละกรณี (a) และ (b)

ให้เริ่มจากวาด Free Body Diagram (FBD), Kinetic Diagram (KD), และตั้งสมการการเคลื่อนที่ของแต่ละกรณี



(a)

FBD

Block A: P (left), N_2 (down), F_{k2} (right), mg (down), N_1 (up), F_{k1} (right)

KD

Block A: ma (left)

$\Sigma F = ma$

$N_2 = mg$

$P - (\mu N_1) - (\mu N_2) = ma$

$P - \mu[mg + N_2] - \mu mg = ma$

$P - 3\mu mg = ma$

$a = \frac{P}{m} - 3\mu g$ #

(b)

FBD

Block A: P (left), N_2 (down), F_{k2} (right), T (right), mg (down), N_1 (up), F_{k1} (right)

KD

Block A: ma (left)

Block B: N_2 (up), T (right), F_{k2} (left), mg (down)

KD

Block B: ma (right)

B: $\Sigma F = ma$

$T - \mu N_2 = ma$

$ma = T - \mu mg$

$T = ma + \mu mg$ ①

A: $\Sigma F = ma$

$P - T - (\mu N_1) - (\mu N_2) = ma$

$P - [ma + \mu mg] - \mu(2mg) - \mu mg = ma$

$P - 4\mu mg = 2ma$

$a = \frac{P}{2m} - 2\mu g$ #

ข้อ 2. (20 คะแนน) แรงและความเร่ง ออกข้อสอบโดย อ.ไพโรจน์ คีร์รัตน์

2.1 จากรูปที่ 1 รถ : มีมวล $m = 2000 \text{ kg}$, เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ 2 m/s^2 ไปตามถนนเอียง


ถนน : เอียงทำมุม $\theta = 20^\circ$, รัศมีความโค้ง $p = 100 \text{ m}$, สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน $\mu_s = 0.2$.

ถ้าโจทย์ให้หาความเร็วน้อยที่สุดของรถ ที่รถสามารถเคลื่อนที่ไปได้โดยไม่ลื่นไถล


จงตอบคำถามต่อไปนี้

(ก) จงตั้งแกนสำหรับใช้วิเคราะห์ปัญหา โดยวาดบนรูปที่ 1 (1 คะแนน)

(ข) จงแสดงแรงบน free-body diagram และผลของแรงบน kinetic diagram โดยวาดบนรูปที่ 1 (2 คะแนน)



Free-body diagram



Kinetic diagram

รูปที่ 1

แกน t
อยู่ในทิศ $\odot$

ma_t อยู่ในทิศ $\odot$

(ค) ถ้ากำหนดให้ $\cos 20^\circ = 0.9$, $\sin 20^\circ = 0.3$ และ $g = 10 \text{ m/s}^2$

จงเขียนสมการของการเคลื่อนที่ $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ ในแกนต่างๆ และแทนค่าด้วยตัวเลขหรือค่าที่โจทย์กำหนดให้ โดยไม่ต้องดำเนินการหาคำตอบ (4 คะแนน)

$$n: \sum F_n = ma_n$$

$$(N \sin 20^\circ + f \cos 20^\circ) = \frac{mv^2}{r}$$

$$N \sin 20^\circ + \mu N \cos 20^\circ = \frac{mv^2}{r}$$

$$0.3N + 0.2N(0.9) = \frac{2000v^2}{100}$$

$$0.418N = 20v^2$$

$$v^2 = 0.0209N \quad \text{--- (1)}$$

$$b: \sum F_b = ma_b$$

$$N \cos 20^\circ = f \sin 20^\circ + mg$$

$$N \cos 20^\circ - \mu N \sin 20^\circ = mg$$

$$N(0.9) - 0.2N(0.3) = 2000(10)$$


$$0.84N = 20000 \quad \text{--- (2)}$$

2.2 จากรูปที่ 2 วัตถุกลมผิวเรียบ : มีมวล $m = 2 \text{ kg}$, เคลื่อนไปตามรางวงกลมในระนาบระดับ โดยการผลักของแขนที่มีร่อง
 ถ้าวัตถุมีตำแหน่ง $r = 2 + \cos \theta$ และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่ 0.5 rad/s ในทิศทางเข็มนาฬิกา
 สมมติให้หา แรงที่แขนรอกกระทำต่อวัตถุทรงกลมนี้ ที่มุม $\theta = 60^\circ$ โดยไม่คิดความเสียดทาน
 เมื่อใช้ $\tan \varphi = \frac{r}{dr/d\theta}$ หาค่ามุม พบว่า $\varphi = -70^\circ$

จงตอบคำถามต่อไปนี้

(ก) จงตั้งแกนแบบรูป สำหรับใช้วิเคราะห์ปัญหา ในรูปที่ 2 (1 คะแนน)

(ข) จงแสดงแรงบน free-body diagram และผลของแรง บน kinetic diagram บนรูปที่ 2 (2 คะแนน)



รูปที่ 2




(ค) ถ้า $a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$, $a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}$, $\cos 60^\circ = 0.5$, $\sin 60^\circ = 0.8$, $\cos 70^\circ = 0.3$ และ $\sin 70^\circ = 0.9$

จงเขียนสมการของการเคลื่อนที่ $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ ในที่ r และ θ และแทนค่าตัวเลขที่โจทย์กำหนด โดยไม่ต้องดำเนินการหาคำตอบ (4 คะแนน)

$r: \sum F_r = m a_r$ $\sum F_r = m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)$ $R \cos 20^\circ = 2(-0.125 - 2.5(0.5)^2)$ $R(0.9) = -1.5$ # $\theta: \sum F_\theta = m a_\theta$ $\sum F_\theta = m[r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}]$ $N + R \sin 20^\circ = 2(2(-0.4)(0.5))$ $N + R(0.3) = -0.8$ #	f_n $r = 2 + \cos \theta$ $\dot{r} = (-\sin \theta) \dot{\theta} = -0.5 \sin \theta$ $\ddot{r} = (-0.5 \cos \theta) \dot{\theta} = -0.25 \cos \theta$ θ $\dot{\theta} = 0.5 \text{ rad/s}$ $\ddot{\theta} = 0 \text{ rad/s}^2$	g, θ $r = 2 + 0.5 = 2.5$ $\dot{r} = -0.4$ $\ddot{r} = -0.125$ $\theta = 60^\circ$
---	---	--

2.3 มวล m ติดอยู่กับปลายเชือกซึ่งมีความยาว L ถ้ามวล m เคลื่อนที่แบบวงกลมอยู่ในแนวระดับ (เป็นการเคลื่อนที่รอบแกนตั้ง) ด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่ ω และเชือกทำมุมกับแนวตั้งเท่ากับ θ (6 คะแนน)

จากรูป จงหาความสูง h และแรงตึง T ของเชือก ในเทอมของ m, L, θ, ω, g



n: $\Sigma F_n = m a_n$
 $T \sin \theta = m \frac{v^2}{r}$ $v = \omega r$


$$T \sin \theta = m \omega^2 r$$

$$T \sin \theta = m \omega^2 (L \sin \theta)$$

$$\boxed{T = m \omega^2 L} \quad \#$$

$$\boxed{h = L \cos \theta} \quad \#$$

b: $\Sigma F_b = m a_b$
 $T \cos \theta = mg$



ข้อ 3. (20 คะแนน) งานและพลังงาน ออกข้อสอบโดย อ.จีระภา สุขแก้ว

1. [Bonus 4 points] อาจารย์ชอบบอกว่า ทั้งหลักการงานและพลังงาน และ หลักการอิมพัลส์และโมเมนตัม ล้วนพิสูจน์มาจาก กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ สองของนิวตัน จงแสดงให้เห็นว่าคำกล่าวที่อาจารย์พร่ำบอกล่ะเป็นจริงได้อย่างไร

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad (+2)$$

$$v dv = a ds \rightarrow \sum F = ma \rightarrow v^2 = u^2 + 2as$$

$$\sum F = m \left[\frac{v^2 - u^2}{2s} \right] \quad a = \frac{v^2 - u^2}{2s}$$

$$\sum F s = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m u^2$$

$$\frac{1}{2} m u^2 + \sum F s = \frac{1}{2} m v^2$$

$$T_1 + U_{1 \rightarrow 2} = T_2$$

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad (+2)$$

$$\sum F = ma$$

$$\sum F = m \left(\frac{v_2 - v_1}{t} \right)$$


$$\sum F t = m v_2 - m v_1$$

$$m v_2 = m v_1 + \sum F t$$

$$m \vec{v}_1 + \sum \int \vec{F} dt = m \vec{v}_2$$

$$m \vec{v}_1 + \sum \int_0^t \vec{F} dt = m \vec{v}_2$$

[Bonus 2 points] จงเปรียบเทียบ งาน เนื่องจาก แรงโน้มถ่วง ในการยกกระต๊อบลูกกอล์ฟมวล m กิโลกรัม ขึ้นสูง ทั้งสามแบบ ดังรูป





[Bonus 4 points] ในการยกกล่องหนักมวล $M=40$ kg ขึ้นที่ระดับสูงขึ้น 1 เมตร ดังรูป อยากทราบว่า ทั้ง สาว Girl และ หนุ่ม Boy ได้

งาน เท่ากันหรือไม่ อย่างไร และ ทั้งสองออก แรง ทำงาน เท่ากันหรือไม่ และ อย่างไร (คำตอบตัวเลข)



สาว Girl

หนุ่ม Boy



$$U_F = FS = (W \sin \theta) s$$

$$U_F = +FS$$

$$= WS$$

$$= 400(1)$$

$$= 400 \text{ J}$$

ถือว่า 3 ครั้ง

$$U_{\text{girl}} = U_{\text{boy}} \quad \#$$

$$F_{\text{girl}} < F_{\text{boy}} \quad \#$$

$$W \sin \theta$$


$$= 400 \left(\frac{1}{5} \right)$$

$$= 80 \text{ N}$$

$$W = 400 \text{ N}$$

2. [4 points] ชายหนุ่มและรถมอเตอร์ไซด์มวลรวม M kg วิ่งมาด้วยอัตราเร็วคงที่ v_0 m/s ชายหนุ่มเหยียบเบรกทันทีที่เห็นคุณครูให้สัญญาณหยุดหน้าโรงเรียน ทำให้ล้อล็อกและไถลไปจนกระทั่งรถหยุด จงหาระยะหยุดหรือระยะที่เขาควรจะเริ่มแตะเบรกเพื่อสามารถหยุดรถได้ทัน ($d=?$) ใช้วิธี งาน&พลังงาน เท่านั้น โดย กำหนดให้ μ_k คือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างล้อรถกับถนน และ g คือความเร่งโน้มถ่วงโลก

[คำตอบ อยู่ในรูปตัวแปรที่กำหนดให้เท่านั้น $\Rightarrow d = f(M, v_0, g, \mu_k)$]



$$\begin{aligned}
 T_1 + y_1 + \sum U_{1 \rightarrow 2} &= T_2 + y_2 \\
 \frac{1}{2} M v_0^2 - F S &= 0 \\
 \frac{1}{2} M v_0^2 &= \mu_k M g d \\
 d &= \frac{v_0^2}{2 \mu_k g} \quad \#
 \end{aligned}$$

[4 points] จากคำตอบที่ได้ สมมุติว่า ถ้าเขาขับรถมาด้วยอัตราเร็ว 36 km/hr เขาจะต้องเหยียบเบรกที่ระยะ $d=5$ เมตร อยากทราบว่า หากเขาขับรถมาด้วยอัตราเร็ว 72 km/hr เขาจะต้องเหยียบเบรกที่ระยะห่างไปเท่าไร จงแสดงวิธีการ ที่ได้มาซึ่งคำตอบด้วยจึงจะได้คะแนน


$$\begin{aligned}
 \text{จาก } d &\propto v_0^2 \\
 \frac{d_2}{d_1} &= \left(\frac{v_{02}}{v_{01}} \right)^2 \\
 \frac{d_2}{5} &= \left(\frac{72}{36} \right)^2 \\
 \therefore d_2 &= 20 \text{ m} \quad \#
 \end{aligned}$$

3. หลังจากอ่านหนังสือทบทวนวิชาเรียนจนเหนื่อย เด็กชาย Boy มวล m kg ก็ออกไปกระโดดน้ำเล่นโดยการโหนเชือกขึ้นแล้วปล่อยตัวลงน้ำดังรูป อัตราเร็วขณะที่เขาวิ่งไปจับเชือกที่ A คือ v_0 m/s กำหนดให้เชือกมีความยาวคงที่ L เมตร หากเขาเริ่มปล่อยเชือกเมื่อเขาขึ้นได้สูงสุดที่ B


[4 points] จงหาตำแหน่งที่เขาขึ้นได้สูงสุดที่ B และ แสดงในรูปของ มุมสูงสุด ($\theta_{\max} = ?$)

[4 points] จงหาแรงตึงในเส้นเชือก ณ ตำแหน่งนั้น ($T_B = ?$)

[คำตอบ อยู่ในรูปตัวแปรที่กำหนดให้ เท่านั้น $\Rightarrow m, v_0, L, g$]



(1).




$$T_1 + \frac{1}{2}mv_1^2 + \sum U_{1 \rightarrow 2} = T_2 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = 0 + mg(L - L \cos \theta)$$

$$\frac{v_0^2}{2gL} = 1 - \cos \theta$$

$$\cos \theta = 1 - \frac{v_0^2}{2gL}$$

$$\theta_{\max} = \cos^{-1} \left[1 - \frac{v_0^2}{2gL} \right] \quad \#$$




$$\sum F_n = ma_n$$

$$T - mg \cos \theta = \frac{mv^2}{r}$$

$$T_B = mg \left(1 - \frac{v_0^2}{2gL} \right) \quad \#$$

4. [4 points] จงหา งาน เนื่องจาก แรงสปริง ในการเคลื่อนที่ไปมาบนพื้นราบของกล่องหนู จากตำแหน่ง 3 ไป ตำแหน่ง 4 ดังในรูป กำหนดให้ ค่าความแข็งดึงของสปริงคือ k N/m และสปริงมีการยึดอยู่ s_3 และ s_4 ที่ตำแหน่ง 3 และ 4 ตามลำดับ




$$U_{Fs} = -\frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2)$$

$$= -\frac{1}{2}k(s_4^2 - s_3^2)$$

#




ข้อ 4. (20 คะแนน) อิมพัลส์และโมเมนตัม และการกระทบ ออกข้อสอบโดย อ.สมชาย แซ่ฮึ้ง

4.1 เครื่องบินลำหนึ่งมีมวล 110 Mg กำลังบินอยู่ในแนวราบด้วยอัตราเร็ว 160 m/s ถ้าเครื่องยนต์พ่นเจ็ทเร่งความเร็ว โดยมีแรงจากเครื่องยนต์เจ็ทกระทำในแนวราบเท่านั้น และมีขนาดเปลี่ยนแปลงตามเวลาดังกราฟ ($F = 200 + 2t \text{ kN}$) จงหาว่าเครื่องบินจะใช้เวลาเท่าไรเพื่อให้มีความเร็วขนาด 200 m/s



$$\begin{aligned}
 & \xrightarrow{+} X: \quad m\vec{v} = m\vec{u} + \int \sum F dt \\
 & \frac{110 \times 10^6}{1000} (200 - 160) = \int_0^t (200 + 2t) dt \times 10^3 \\
 & 110 \times 40 = \left(200t + \frac{2t^2}{2} \right) \Big|_0^t \\
 & 4400 = 200t + t^2 \\
 & t^2 + 200t - 4400 = 0 \\
 & (t - 20)(t + 220) = 0 \\
 & t = 20, -220 \text{ s} \quad \#
 \end{aligned}$$

4.2 ในการตีเทนนิส ลูกบอลมวล 0.2 kg เข้ากระทบไม้เทนนิสในแนวตั้งฉากกับหน้าไม้ด้วยอัตราเร็ว 30 m/s ถ้าลูกบอลกระเด็นกลับไปในแนวเดิมด้วยอัตราเร็ว 50 m/s และพบว่าขนาดแรงที่กระทำต่อลูกบอลเป็นดังกราฟ จงหาขนาดแรงกระทำสูงสุดที่ลูกเทนนิสถูกกระทำ



จาก $m\vec{v} = m\vec{u} + \int \Sigma F dt$

$\leftarrow m\vec{v} - m\vec{u} = \boxed{\int \Sigma F dt}$ Area

$$0.2(+50) - 0.2(-30) = F(0.4)$$

$$F = 40 \text{ N} \quad \#$$